

果胶铋联合安胃疡治疗慢性萎缩性胃炎 102 例疗效观察

福建莆田市第二医院(351100) 蔡丽英 林佳芬 卓秀凤

近几年来,我们应用“安胃疡”胶囊联合果胶铋治疗 CAG 的临床观察中,收到较为满意的疗效。

1 病例选择

随机分为治疗组 102 例,其中男性 65 例,女性 37 例;年龄最大者 69 岁,最小者 28 岁,平均年龄 39 岁;病程最长者 16 年,最短者 2 年,平均病程 4.32 年;对照组 38 例,男性 24 例,女性 14 例,两组资料经统计学处理,年龄、病程、病理类型及病变程度均无显著性差异,具有可比性。两组计 140 例均经病理检查诊断为 CAG。

2 治疗方法

治疗组:果胶铋每次 2 粒,每日 4 次,安胃疡每次 2 粒,每日 4 次,连续服用三个月为一个疗程;对照组:果胶铋每次 2 粒,每日 4 次,连续服用三个月为一个疗程。

3 疗效观察

3.1 临床症状的消失缓解率

治疗组与对照组的患者,经治疗后症状均有不同程度的改善,我们对 CAG 常见的五个症状:胃痛、胃脘胀满、嗝气、食欲不振、神疲乏力进行对比分析,结果显示除胃脘胀满二者无显著性差异外,其他症状的消除方面治疗组均优于对照组 ($P<0.05$),具体见表 1。

表 1 安胃疡对 CAG 症状消除率的比较

组别	胃痛(%)	胃脘胀满(%)	嗝气(%)	食欲不振(%)	神疲乏力(%)
治疗组	92.68(76/82)	83.95(65/81)	89.33(68/81)	92.64(63/68)	91.04(61/67)
对照组	70.0(2/30)	84.38(27/32)	70.37(19/27)	74.07(20/27)	62.96(17/27)

3.2 疗效比较

治疗组 102 例慢性萎缩性胃炎中,1 年后总有效率为 90.2%。对照组总有效率为 71.05%,说明安胃疡联合果胶铋治疗 CAG 的临床疗效显著优于单纯应用果胶铋对照组,具体见表 2。

表 2 安胃疡治疗 CAG 临床疗效比较

组别	例数	近期临床治愈数(率)	显效数(率)	有效数(率)	无效数(率)
治疗组	102	44(43.14%)	32(31.37%)	16(15.69%)	10(9.80%)
对照组	38	4(10.53%)	11(28.95%)	12(31.58%)	11(28.95%)

4 讨论

我们在临床应用“安胃疡”联合果胶铋治疗 CAG 收到较好的疗效。进一步说明安胃疡确实具有保护胃粘膜溃疡表面,有效抑制胃液、胃蛋白酶的分泌,增强胃粘膜屏障,愈合溃疡面防止出血,解痉止痛,抗疲劳及增强免疫功能等多种药理作用,用果胶铋联合安胃疡治疗 CAG 伴肠化生及不典型增生有较好的疗效。所以安胃疡胶囊联合果胶铋治疗慢性萎缩性胃炎疗效客观可靠,值得推广。